

四庫全書

經部

欽定四庫全書

儒門事親卷十一

金 張從正 撰

風論

論曰人之生也負陰而抱陽人居一氣道在其中矣外有八邪之相盪內有喜怒之交侵真氣內弱風邪襲之風之傷人或為寒熱或為疼痛或為偏枯或為拘攣其候不一風者善行而數變此乃風者百病之始萬病之

長也蓋內不得通外不得泄此謂之病生於變亂也或失音而昏冒或口目而喎斜可用二聖散吐之或不知人事者或牙關緊急者粥不能下不能嚥者煎三聖散鼻內灌之吐出涎沫口自開也次服無憂散通解丸通聖涼膈人參半夏丸桂苓甘露散消風散熱除濕潤燥養液之藥排而用之切忌雞豬魚兔油膩酒醋蕎麥動風之物及引痰之食

大凡頭風眩暈手足麻痺胃脘發痛心酸滿悶按之有

聲皆因風風寒濕三氣雜至合而為痺也在上謂之
停飲可用獨聖散吐之吐訖後服清上辛涼之藥通
聖散加半夏之辛仲景云此痰結胸中而致也

大凡風癘病發項強直視不省人事此乃肝經有熱也
或有咬牙者先用苧麝苦酒湯吐之吐後可服瀉青
丸下之次服加減通聖散顯咬牙證用導赤散治之
則愈如病發者可用輕粉白礬礞石代赭石發過米
飲調之經云重劑以鎮之

大凡人病雷頭懶干俗呼之謬名也頭痛昏眩皆因浴髮而得之即為首風此因邪風在於胸中熱甚化而為痰風之所致也可以茶調散吐之吐訖次用藏用丸下之後可服烏荊丸若是雷頭者上部多有赤腫結核或面熱無汗經云火鬱發之開導之決之可用鉗鉞出血則愈靈樞經云奪血者無汗奪汗者無血血汗俱蕩豈不妙哉衰老者可用涼膈解毒消風散熱為治年壯者可以蕩滌積熱大黃牽牛氣血宣通

便無壅滯而愈

凡人患目腫經年不瘥俗言頭風所注更加頭痛者豈
非頭風者歟此乃足厥陰肝之經手少陰心之經兼
五臟俱有大熱也可先用通解丸通利大小便大黃
越桃飲子治肝熱者羌活決明散服之大有神效矣
凡目有淚出俗言作冷淚者非也內經曰肝液不禁此
大熱薰蒸於肝也熱極生風風衝於外火發於內風
熱相搏此大淚出也內外皆治可以愈也治外以貝

母一枚白膩者加胡椒七枚不犯銅鐵細研臨卧點之治內者去風散熱之劑可用當歸飲子服之陽熱極甚者目睛發痛不可忍者可用四物湯加漢防己草龍膽送下神芎丸五七十九利三五行則愈

凡人病痰發者其證不一蓋有五焉一曰風痰二曰熱痰三曰濕痰四曰酒痰五曰食痰諸痰在於膈上使頭目不能清利涕唾稠粘或咳唾喘滿或時發潮熱可用獨聖散吐之次服加減飲子或疏風丸間而服

之內經曰所謂流濕潤燥之義也

凡人但冒風邪溫病前三日在表未入於裏其候頭項強痛身熱惡風寒有汗無汗腰痛不得俛仰可用益元散五錢通聖散五錢相合服之名曰雙解散用水一大椀生薑十餘片連鬚葱白五七莖豈豉一撮煎至三五沸去滓先服大半良久以釵子探咽喉中吐出痰涎不可嗽口次又服少半投之如未汗出更用葱醋酸辣湯再投之衣被蓋覆汗出則愈矣氣交變

大論云歲火太過炎暑流行火氣大劇肺金受邪上
應熒惑大而明現其病熱鬱可用辛涼之劑萬舉萬
全夫擾攘之世藥宜辛涼以解火治世人民安靜如
用升麻葛根湯敗毒散辛溫之劑亦無加害亦可加
葱白鹽豉上而越之表而解之內經曰因其輕而揚
之揚者發揚也吐汗之後宜大將息旬日之後不可
犯之犯之其病復作也

凡傷寒疫癘一法若無藥之處可用酸醃汁一大椀煎

三五沸去菜葉飲訖候少時用釵子咽喉中探吐如此三次再煎葱醋湯投之衣被蓋覆汗出而瘥內經曰酸苦涌泄為陰傷寒三日頭痛身熱病在上宜涌之涌後以淡粥養之

又一法用鳳凰臺散噴於鼻內連嚏二三十次噴藥時坐于煖室中嚏罷以漿水粥投之衣被蓋之汗出而愈嚏法同吐法用之

一法導引若無藥處用之令人盤兩足而坐以兩手

交十指攀頭後風池風府二穴此風之門也向前仰
首數至於地如此連折點地一百二十數急以酸醋
白湯投之汗出即解

凡男子婦人小兒手足麻痺肌肉不仁者風寒濕三氣
相雜至合為痺先用黃芩芍藥湯吐之吐訖次用通
解丸通經而瀉之瀉訖更用辛甘之劑汗之汗瀉之
後可用當歸清涼飲子兼烏荊丸除濕丹和血行經
之藥則愈矣

凡人病痰證發者比前論更多有三證顯證共成五也
一曰風痰二曰熱痰三曰濕痰四曰酒痰五曰食痰
諸痰在口上焦毒薰於頭者諸陽之會首也故令病
人頭重目溢涕唾稠粘或咳嗽喘滿時發寒熱可用
赤小豆湯吐之吐後各隨其證而治之可服消風去
熱導濕化痰者可服通聖加半夏導氣之劑豈不妙
哉如新暴風痰者形寒飲冷熱痰者火盛制金濕痰
者停飲不散可服加減連翹飲子除濕丹無憂散亦

有酒痰者解毒三聖丸主之五者食痰可用漢防已
丸丹砂選而治之若依法服之決有神効

論火熱二門

凡傷寒中風溫疫時氣冒暑感四時不正之氣若邪毒
之氣人或感之始于巨陽受之二日陽明受之三日
少陽受之前三日在于表陽也後三日在于裏陰也
內經熱論通謂之傷寒熱病者言一身之熱氣也傷
寒者外感于寒邪也夫傷寒之寒熱者惡寒為表熱

裏和故惡寒脉浮大也發熱為裏熱表和故發熱脉滑實也可以吐法而解之用拔雪湯主之生薑葱白豈政同煎葶藶苦酒湯上而越之若病人脉沉實者或不大便喘滿譫語不必拘日數急攻于裏可用通解丸胃中渴燥者大承氣湯下之慎不可用銀粉芭荳粉霜杏仁芫花熱性之藥用之必致危殆仲景云調理傷寒者皆在汗下之理當明表裏無不愈矣差之毫釐失之千里深可慎之汗下之後切宜慎口可

服淡粥而養之不然其病復作

又論傷寒七八日潮熱腹滿發黃有斑者何臟使然
內經云手太陰肺經足太陰脾經足陽明胃經手少
陰心經此四經受病也仲景云兩寸口脉俱浮滑胸
中有痰攻上者可用葶藶散吐之吐後隨證調法處
藥發黃之證皆因陽明中風太陽中濕瘀血與宿穀
相搏令人發黃煎梔子茵陳蒿湯調加減五苓散服
之後利小便快者如皂角色汁此為効矣發斑者心

經受熱故有此證詳斑輕重用藥之理輕者斑紅可
用越桃飲子重者斑紫毒氣胃中盛也大青四物湯
玄參升麻湯主之漸熱腹滿者謂邪熱在胃中也可
以蕩滌邪熱流濕潤燥宜急治之雜病寸口脉沉實
者亦在胸中有啓玄子注云上盈不愈者吐而奪之
此病乃瘳矣斑黑者危而難治也黃病血病問其小
便利與不利也驗又有頭痛數日不止者此乃六陽
受病也手之三陽從手走至於頭足之三陽從下走

至於上蓋六陽之聚會也久痛不愈者令人喪目以
胸膈亦有宿痰故也先以羌活散涌之以川芎石膏
散白虎湯選而服之則愈矣

又一法治頭痛不愈者可煎連鬚葱白豈豉湯多服
之後吐為効吐後可服川芎薄荷湯辛涼之劑清上
之藥疎風丸散之類仲景云傷寒頭痛脉寸口急而
頭痛是也

凡男子有病面黃身熱肌瘦寒熱往來如瘧狀更加涎

嗽不止或喘滿面目浮腫者或身體俱熱或有自汗
內經云病名傷寒夾勞之證也治之奈何病在上者
其高者因而越之可用防己散吐之吐後初用通解
丸一服次服人參黃耆散當歸飲子加減小柴胡湯
擇而用之內經謂男女之證皆同類用其治法也依
此調治無不取效矣

凡人病心胸痞悶不欲飲食身體壯熱口燥舌乾大小
便不利有一工治之說下元虛冷便投煖藥十數服

其病不愈又一醫所論與前亦同又投煖藥五七日其證轉加困弱請余治之診脉而說曰審問日數飲食大小便何似小便赤色大便黑色便言傷寒瘀血之證初用大黃芍藥湯二劑次服犀角地黃湯二服後用通經丸一服換過大便黃色以為効驗此藥服十餘服方可病瘥矣

凡男子婦人所顯證候皮膚發熱肌肉消瘦四肢倦怠兼有頭痛頰赤心忪唇乾舌燥日晡潮熱夜有盜汗

涕唾稠粘胸膈不利或時喘嗽五心煩熱睡卧不安
飲食減少多思水漿經脉不通病名曰何病奇病論
曰女子不月血滯之病也男子腎虛精不足也凡治
此證降心火益腎水此之謂也可先用通解丸瀉三
二行次服當歸飲子又用加減五苓散木香三稜丸
人參黃耆散犀角散之類詳其虛實選而用之若咯
膿咯血大小便血但亡血者不可宣吐勿服酸辛熱
物薑附之類藥不可不戒慎也若犯諸亡血之證者

不可發汗不可溫補脾胃之藥若服之雖進飲食不生肌肉此病轉加危篤乃成虛勞之病也

凡醫人不明發表攻裏亂投湯劑有悞性命更大忌夏月燔灸中脘臍下關元氣海背俞三里等燔灸千百壯者全無一効使病者反受其殃豈不痛哉虛勞之疾私嗜肉食麵辛酸之物不可食之但可食者謹按神農食療而與之菠稜葵菜冰水清涼之物不可禁也且圖寒涼滑利腸胃使氣血並無壅礙燥溢經曰

穀入于胃脉道乃行水入於經其血乃成若不及慎
致令病人胃口閉澁則形體漸瘦此乃死之由也諸
勞皆倣此但諸人咯膿血衄血大小便血者可服三
黃丸黃連解毒丸涼膈散加桔梗當歸大黃芍藥犀
角地黃湯大作劑料時時呬之內經曰所謂邪熱傷
於肝心之病依此調治萬舉萬全矣

凡人年四十以上日久多言以致虛損面色黧黑飲食
無味心胸痞悶四肢倦怠肌體餘熱大小便不利治

之奈何內經曰不可執補之夫男子腎虛水不足也
凡補虛之劑多用烏附天雄之類豈知腎惡燥也女
子陰虛血不足也凡補虛多以陽劑是以知陽勝而
陰虧也不可用性熱之藥補之空心可服加減八物
丸當歸飲子減桂五苓散煩渴加益元名曰淡滲散
更服通解丸顯仁丸亦可服之大有神効

凡人有臟毒下血何謂也生氣通天論曰邪熱傷肝因
而大飽筋脉橫解腸癖為痔故膿血者血隨熱行參

差入于腸胃之間乃成瀉血也若身體壯熱則為難
治身涼者可治也可先調中消血蕩除積血瀉之三
二行瀉後服芍藥藥皮丸黃連解毒湯五苓散益元
散各停新汲水調下五七錢甚者取地黃汁半盞服
之則愈矣

凡下利膿血腹痛不止者何也諸痛痒皆屬於心火也
可用通解丸加減瀉之量其虛實用之次用消濕散
加生薑大棗芍藥服之瀉訖又用新水調五苓散服

之

又一法煎燈心湯調下益元散五七錢此病大忌油
膩腥葷熱物

濕熱門

凡吐嘔而瀉病名曰何也內經熱論云此乃轉筋霍亂
之證也何氣使然此乃邪氣在于中焦使陰陽二氣
不能升降其證心痛而吐吐則先腹痛而瀉心腹俱
痛則吐瀉並作使致揮霍之間自然撩亂此證喜寒

涼之物可用冰水調五苓益元則愈矣大忌熱物
轉筋之病治之奈何經曰勞者溫之溫者溫存之意
也

又一法生薑湯益元散白朮散禹攻散加水沉冷細
細呷之渴未止者頻頻飲之如無冰新汲水亦得用
之大忌白粥米湯桂附種種之燥藥不可服之服之
必死如無藥處可服地漿地漿者掘地作坑注新水
于其中攪渾旋旋取澄清者飲三五盞立愈

凡大人小兒暴注水瀉不止內經曰此名暴速注瀉久而不愈者為涌泄注下此乃火運太過之病也火注暴速故也急宜用新汲水調下甘露飲子五苓散天水散或用井花水煎此藥放冷服之病即瘥矣不可用御米殼乾薑豈菝聖散子之類縱然瀉止腸胃氣滯不通變為腹脹此法宜分陰陽利水道乃為治法之妙也

上古天真論云一陰一陽之謂道故男女有陰陽之質

不同則天癸精血之形亦異陰靜而海滿血溢陽動而應合精泄二者通和故能有子易繫辭曰男女構精萬物化生人稟天地而成形也

風門

凡風中失音悶亂口眼喎斜內經曰風之為病善行而數變感則害人有倉卒之變故百病皆生於風也可用三聖散鼻內灌之吐出涎口自開也如不省人事牙關緊閉粥藥不能下者用此藥如無此證可三聖

散吐之次服通聖涼膈人參半夏丸桂苓甘露散等
切忌雞猪魚兔酒醋蕎麥麵動風之物引痰之食吐痰
之法在方論中

凡頭風眩暈手足麻痺胃脘發痛心腹滿悶按如水聲
可用獨聖散吐之吐訖可用清上辛涼之藥仲景曰
此寒痰結在胸中而致然也

凡癰病至于呆證者用三聖散吐之於煖室中勿令透
風可以汗下吐三法俱行次服通聖散百餘日則愈

凡雷頭懶干俗呼之謬名也此疾胸中有寒痰由多沐
之所致也可以茶調散吐訖三二升次用神芎丸下
訖三五行然後服愈風餅子則愈矣此雷頭者是頭
上有赤腫結核或如酸棗狀可用銚鍼出血則愈矣
凡赤目經年不愈是謂頭風所注更加頭痛可用獨聖
散吐之次服洗心散八正散之類赤目腫作是足厥
陰肝經有熱用利小便瀉肝經除風熱之寒藥則愈
矣

凡風衝泣下俗呼為冷淚者謬也內經曰太陽不能禁固因風衝于外火焚于內風熱相搏由此泣下內經曰熱則五液皆出熱甚則淚出治之以貝母一枚白膩者佳胡椒七枚不犯銅鐵研細點之臨卧治法曰風宜辛散寒宜甘發氣遇寒則凝血得熱則散

凡諸痰在於膈上使頭目不能清利涕唾稠粘或欬嗽喘滿時發潮熱可用獨聖散吐之次服搜風丸之類內經曰所謂流濕潤燥之義也

凡冒風時氣溫病傷寒三日已裏頭痛身熱惡寒可用
通聖散益元散各五七錢水一大椀入生薑十餘片
連鬚葱白十餘莖豈豉一撮同煎三五沸去滓先服
多半良久以釵子探於咽中吐了不得嗽口次用少
半投之更用酸辛葱醋湯投之衣被蓋覆汗出則解
夫擾攘之世常與內經歲火太過同法歲火太過炎
暑流行火氣大劇金肺受邪上應熒惑大而明顯若
用辛涼之劑解之萬舉萬全人民安靜則便同水化

可以升麻湯葛根湯敗毒散辛溫之劑解之雖有潮熱亦無加害亦可加荳豉葱白上涌而表汗自出內經曰因其輕而揚之揚者發揚也吐汗所以發寒熱之邪也吐汗之後必大將息旬日之後其邪不復作也

凡大人小兒風濕寒三氣合而為痺及手足麻痺不仁內經曰榮虛衛實皮膚不仁痺而不知痒痛可用葯金散吐之次服導水丸輕寒之藥泄之泄訖次以辛

溫之劑發散汗出後常服當歸芍藥烏附行經和血之藥則愈矣

凡風蛀牙疼久不愈者用針籤芭荳一枚以燈燎之煙盡存性於牙根盤上燻之則愈

凡泄瀉米穀不化日夜無度腹中雷鳴下利完穀可用導水丸禹功散泄之或病人老弱氣虛可用無憂散泄之再觀病勢強弱候一二可服胃風湯以治其風如不愈者更服桂枝麻黃湯汗之則愈內經曰夫風

之中為腸風飧泄啓玄子云風入胃中上薰於胃故
食不化而下泄又云暮食不化為飧泄又經云春傷
於風夏為飧泄故風宜出汗腸中鳴者風以動之動
而有聲慎不可用罌粟苴蔻乾薑太燥之藥病漸者
燥之去其濕則愈病甚者攻之不動反能為害經曰
其減則漸其加則甚可用五苓散去豬苓加人參散
凡富貴膏粱之家病瘧或間日或頻日發或熱多寒少
或寒多熱少宜大柴胡湯下過三五行次服白虎湯

或玉露散桂苓甘露散之類如不愈者是積熱太甚以神芎三花神祐丸調胃承氣湯等大作劑料下之下後以長流水煎五苓散服之或服小柴胡亦可或先以常山散吐之後服涼膈白虎之類必愈矣大忌發熱之物猪雞魚兔五辛之物犯之則再發也

凡田野貧寒之家病瘧為飲食麓糲衣服寒薄勞力動作不與膏粱同法臨發日可用野夫多効方中溫脾散治之如不愈服辰砂丹治之必愈矣如喫罷此藥

以長流水煎白虎湯服之不服食熱物為瘧疾是傷暑伏熱故也內經曰夏傷於暑秋必病瘧

凡男子婦人骨蒸熱發皮膚枯乾痰唾稠粘四肢疼痛面赤唇焦盜汗煩燥睡卧不安或時喘嗽飲食無味困弱無力虛汗黃瘦等證內經曰男子因精不足女子因血不流而得此證可以茶調散輕涌訖次以導水丸禹功散輕瀉三五行後服柴胡飲子桂苓甘露散犀角散之類大搜風丸白朮丸調中湯木香檳榔

九人參散量虛實選而用之或咯血便血諸亡血者
並不宜吐不可不慎勿服峻熱薑附之藥若服之
飲食難進肌肉消減轉加危篤五勞之病令人不明
發表攻裏遂悞至此大忌暑月於手腕足踝上著灸
以其手足者諸陽之表起于五指之外內經曰諸陽
發四肢此穴皆是淺薄之處灸瘡最難痊也及胸穴
中腕臍下背俞三里等穴或有灸數百壯者加以燔
針畧無寸効病人反受苦楚可不思之勞疾多饒所

思之物但可食者宜照食療本草而與菠菜葵羹水
水涼物慎不可禁且因水穀入胃脉道乃行也若遇
禁則胃口閉而形體漸瘦而脉大乃死之候也諸勞
皆微此

凡病人虛勞多日無力別無熱證者宜補之可用無比
山藥丸則愈矣

凡痔漏腫痛內經曰因而大飽筋脉橫解腸癖為痔而
不愈變為漏痔與漏其治同法至真要大論云太陽

之勝凝凜且至非時水冰痔瘡取法注云水氣太勝
陽火不行此言陽火畏水鬱而為痔又少陰之復痲
疹瘡瘍癰疽痔注云火氣內蒸金氣外拒陽熱內
鬱故為痲疹瘡瘍疹甚亦為瘡也熱少則外生痲疹
熱多則內結癰疽小腸有熱則中外為痔其熱復之
變皆病於身後及外側也又靈樞云太陽經虛則為
痔瘡癩疾蓋水虛則火所乘故也可先用導水丸禹
功散瀉訖次服枳殼丸木香檳榔丸更以葵羹菠菜

通利腸胃大忌房室雞魚酒醋辛熱之物

凡富貴之人痰嗽多是厚味所致內經云所謂味厚則發熱可服通聖散加半夏以止嗽更服人參半夏丸以化痰墜涎止嗽定喘貧乏之人多感風冷寒濕內經曰秋傷於濕冬生欬嗽可服寧神散寧肺散加白朮之類若欬極面赤煩冤半晌者此火化乘肺也宜詳辨之

凡大人小兒病沙石淋及五種淋澀癃閉并臍腹痛益

元散主之以長流水調下蓋因熱在膀胱燥其津液
故俗謂冷淋者天下之通弊也五苓散減桂加益元
散名曰淡滲散凡兩目暴赤痛者腫不止睛脹胛肉
結成翳膜速宜用稗草左右鼻竅內彈之出血立愈
病甚人頤上百會穴攢竹眉間皆可出血則愈矣口
噙水緊扣衣領不可便噴水候血盡便吐了水蓋暴
赤腫痛乃龍火之疾養成之熱也難經曰目得血而
能視不得已而用之血化淚痛而所出經曰本病相

傳先以治其氣急則治其標緩則治其本

又一法兩目赤腫發痛不止用長流水煎鹽湯吐之
次服神芎丸四物湯之類經曰暴病暴死皆屬於火
也又曰治病有緩急急則治其標緩則治其本標者
赤腫也本者火熱也鹽湯鹹寒所以制火兩目赤腫
痛不能開者以青金散鼻內嚙之嚏之真氣上涌邪
氣自出

凡大人小兒口瘡唇緊用酸漿水洗去白痂臨卧貼赴

筵散如不愈貼鉛白霜散必愈矣

凡婦人男子喉閉腫痛不能言者刺兩手大拇指爪
如韭菜少商井穴也以鉗鍼淺刺去血立愈如不愈
以溫血湯口中含漱是以熱導熱之法也

凡頭腫痛癩癰及胸臆肱脇之間或有瘡痂腫核不消
及膿水不止可用滄鹽一二兩炒過以長流水一大
椀煎之放溫作三五次頓服訖良久於咽喉中以釵
股探引吐之去冷痰三二升次服和血通經之藥內

經曰鹹味涌泄為陰銅人記少陽起於目銳眥行耳後下脇肋過期門瘰癧結核馬刀挾癭足少陽膽經多氣少血之病也

凡癭袋脹悶養生論云兩山挾水其人多癭疾土厚水深其人多癭地勢使然也此可服人參化癭丹自消癭藥多用海藻海帶味屬鹹寒

凡背瘡初發便可用藏用丸玉燭散大作劑料下臍腑一二十行次用銚針於腫焮處循紅暈周匝內密刺

三層出血盡以溫軟帛拭去血甚者百會委中皆出
後用陽起散傅之不可便服十味內托散其中犯官
桂更用酒煎男子以背為陽更以熱投熱無乃太熱
乎

凡便癱者謬名也乃男子血疝也難素所不載然而
厥陰肝之經絡是血流行之道路也衝脉任脉督脉
亦屬肝經之旁絡也難經曰男子七疝血疝者乃七
疝之一也治以導水丸桃仁承氣湯或抵當湯投之

同瘀血法聚而不散可以大作劑料大瀉一二十行
次以玉燭散和血通經之類是也世人多用大黃牡
蠣間有不愈者是不知和血通經之道也

凡下疳久不愈者俗呼曰臊疳可以導水丸禹功散先
瀉肝經訖以木香散傅之日上三兩度後服淡粥一
二日止

凡一切惡瘡久不愈者以木香檳榔散貼之則愈矣
凡男子婦人欬逆俗呼曰吃忒乃陰陽不和之故火欲

上行為寒所抑寒不勝火故作凝滯之聲傷寒亦有此證並宜既濟散治之

濕門

凡男子婦人病水濕瀉注不止因服葶菴烏梅薑附酸熱之劑經曰陽氣耗減於內陰精損削於外三焦閉溢水道不行水滿皮膚身體痞腫面黃腹大小便赤色兩足按之陷而不起內經曰諸濕腫滿皆屬脾土可用獨聖散吐之如時月涼寒宜於煖室不透風處

用火一盆藉火力出汗次以導水禹功量病人虛實
瀉十餘行濕去腫減則愈矣是汗下吐三法俱行三
法行畢臟腑空虛先宜以淡漿粥養腸胃三兩日次
服五苓益元同煎或燈心湯調下亦可如大勢未盡
更服神功散可以流濕潤燥分陰陽利水道既平之
後宜大將息慎忌油鹽酒菓房室等事三年則不復
作矣

凡上喘中滿酸心腹脹時時作聲痞氣上下不能宣暢

叔和云氣壅三焦不得昌是也可用獨聖散吐之次
用導水禹攻散輕瀉三四行使上下無礙氣血宣通
並無壅滯後服平胃散五苓散益元甘露散分陰陽
利水道之藥則愈矣

凡老人久病大便澁滯不通者可服神功丸麻仁丸時
時服葵羹菠菜自然通利也

凡三消者內經所謂肺消渴等可取生藕汁服之則愈

寒門

經曰寒瘍流水俗呼為凍瘡因冬月行于冰雪中而得此證或經年不愈者用坡野中淨土曬乾以大蒜研如泥土捏作餅子如大觀錢厚薄量瘡口大小貼之以火艾加于餅上灸之不計壯數以泥乾為度去乾餅子再換濕餅灸不問多少直至瘡痂覺痛癢是瘡活也然後口含漿水洗漬用雞翎一二十莖縛作刷子於瘡上洗刷淨以此洗刷不致肌肉損傷也以軟帛拭乾次用木香檳榔散傅之如夏月醫之更妙

內傷

凡一切冷食不消宿食不散亦類傷寒身熱惡寒戰慄
頭痛腰脊強不可用雙解散止可導飲九木香檳榔
九五六十九量虛實加減利五七行所傷冷物宿酒
推盡頭痛病自愈矣次以五苓散生薑棗煎用長流
水煎取五六錢不可服酒癥丸進食丸此藥皆犯芑
豈有大毒故也

凡膏粱之人起居閒逸奉養過度酒食所傷以致中脘

留飲惡悶痞膈醋心可服木香導飲丸治之若田野
芻蕘之人食疎衣薄動作勞役若酒食所傷心腹滿
悶醋心時時吐酸水可用進食丸以其勝毒也病甚
者每月瀉三五次

凡一切沉積或有水不能食使頭目昏眩不能清利可
茶調散吐之次服七宣丸木香檳榔丸

凡人咳嗽一聲或作悲笑啼泣擡鼻重物忽然腰痛氣
刺不能轉側或不能出氣者可用不卧散嚏之汗出

痛止

外傷治法

凡一切刃器所傷用風化石灰一斤龍骨四兩二味為細末先於端四日採下刺薊菜於端午日五更合搗和成團子中間穿眼懸於背陰處陰乾搗羅為末於瘡上摻貼亦得裏外臙瘡并諸雜瘡皆効

凡犬咬蛇傷不可便貼膏藥及生肌散之類內經云先治內而後治外可也先當用導水丸禹功散之類可

瀉驚恐不散毒氣或瀉十餘行即時痛減腫消然後
可用膏藥生肌散之類傳之則愈矣

凡一切蟲獸所傷及背瘡腫毒杖瘡焮發或透入裏者
可服木香檳榔丸七八十九或至百餘丸生薑湯下
五七行量虛實加減用之內經曰先治內而後治外
是也

凡落馬墜井因而打撲便生心恙是痰涎散於上也內
經曰所謂因氣動而病生於外宜三聖散空心吐之

如本人虛弱瘦瘁可用獨聖散吐之後服安魄之藥
如定志丸之類牛黃人參朱砂之屬

婦人風門

凡婦人頭風眩暈登車乘船眩暈眼溢手麻髮脫健忘
喜怒皆胸中宿痰所致可用菘蒂散吐之次以長流
水煎五苓散大人參半夏丸

凡婦人腰膝痛兩脚麻木惡寒喜暖內經曰風寒濕合
而為痺先可服除濕丹七八十九量虛實以意加減

次以禹攻散投之瀉十餘行清冷積水青黃涎沫為
驗後用長流水煎生薑棗同五苓散服之風濕散而
氣血自和也

凡婦人乳癰發痛者亦生于心也俗呼吹妳是也吹者
風也風熱結于乳房之間血脉凝注久而不散潰腐
為膿宜用益元散生薑湯調下冷服或新汲水時時
呷之勿輟晝夜可三五十次自解矣或煎解毒湯頓
服之

火類門

凡婦人月事沉滯數月不行肌肉漸減內經曰小腸熱已滿移熱於大腸則伏瘕為沉沉者月事沉滯不行故云伏瘕急宜桃仁承氣湯加當歸大作劑煎服不過三服立愈後用四物湯補之更服宣明中檳榔丸

凡婦人血崩或年及四十已上或悲哀太甚故然內經曰悲哀太甚則心系急心系急則肺舉而上焦不通

熱氣在中故經云血崩下心系者血山也如久不愈則面黃肌熱瘦弱慎不可以熱治之蓋血得熱而散故禁之宜以當歸散等藥治之

凡婦人年五十以上經血暴下婦人經血終于七七之數數外暴下者此乃內經所謂火主暴速亦因暴喜暴怒憂愁驚恐致然慎勿作冷病治之如下峻熱藥治之必死宜黃連解毒湯以清上更用蓮殼棕毛灰以滲其下然後用四物湯玄胡索散涼血和經之

藥

凡婦人月事不來室女亦同內經曰謂月事不來皆是胞脉閉也胞脉者屬心而絡于胞中令氣上通於肺心下不通故月事不來也可用茶調散吐之次用玉燭散芎藭湯三和湯桂苓白朮散之類降心火益腎水開胃進食分陰陽利水道之藥皆是也慎勿服峻熱有毒之藥若服之變成肺痿骨蒸潮熱欬咯膿嘔血喘滿小便不利寢汗不止漸至形瘦脉大雖遇

良醫亦成不救嗚呼人之死者豈命使之然也

凡懷孕婦人病瘧可煎白虎湯小柴胡柴胡飲子等藥
如大便結硬可用大柴胡湯下微利過不可大吐瀉
恐傷其孕也經曰夏傷於暑秋必痲瘧

凡雙身婦人傷寒時氣溫疫頭痛身熱可用升麻散一
兩水半椀大作劑料去滓分作二服先一服吐了後
一服勿吐次以長流水加生薑棗煎五苓散熱服之
汗盡頭痛立止

凡婦人雙身大小便不利可用八正散大作劑料去滑石加葵菜子煎服經曰膀胱不利為癃癃者小便閉而不通也如八正散加木香取効更捷經曰膀胱氣化則能出焉然後服五苓散三五服則愈矣

凡婦人身重九月而瘖瘖不言者是胞之絡脉不相續也故不能言經曰無治也然有是言不若煎玉燭散二兩水半椀同煎至七分去滓入蜜放溫時時呷之令火下降肺金自清故聲復出也肺主聲音也

凡婦人難產者皆因燥澁緊斂故產戶不得開通宜先於降誕之月自月之日用長流水調益元散日三服產必易產後亦無一切虛熱氣血不和之疾如未入月則不宜服之以滑石滑胎故也

凡婦人大產後或臍腹腰痛乃敗血惡物之致然也醫者便作虛冷以燥熱藥治之誤已久矣難經曰諸痛為實實者熱也可用導水丸禹功散瀉三五行然後以玉燭散和血通經降火益水之藥治之獨不可便

服黑神散燥熱之藥當同半產治之

凡婦人產後心風者不可便作風治之宜調胃承氣湯
二兩加當歸半兩細劉用水三四盞同煎去滓分作
二服大下三五行則愈矣如未愈以三聖散吐之蓋
風狂便屬陽

凡婦人產後一二日漸熱口乾可用新汲水調玉燭散
或水調甘露散亦妙勿作虛寒治之

濕門

凡婦人赤白帶下或出白物如脂可服導水丸禹功散
或單用無憂散量虛實加減泄訖服桂苓散五苓散
葶藶木香散同治濕法或用獨聖散上涌亦是室女
白帶下可用茶調散吐之吐訖可服導水丸禹功散
瀉之次服葶藶木香散四物湯白朮散之類則愈矣
治白帶者同瀉濕法則是也婦人有濁污水不止亦
同此法也

寒門

凡婦人年二三十無病而無子經血如常或經血不調者乃陰不升而陽不降此上下不得交通有所滯礙不能為用故也可用獨聖散通訖寒痰二三升後用導水丸禹功散泄三五行或十餘行單用無憂散泄十餘行見寒熱虛實用之次服葱白粥三五日胃氣宣通腸中得實可服玉燭散更助白朮散茯苓之類降火益水既濟之道當不數月而有孕內經曰婦人有瘕痔遺溺嗑乾諸證雖服妙藥針灸亦不能孕

蓋衝脉督脉任脉有此病不能孕故也

半產

凡婦人半產俗呼曰小產或三四月或五六箇月皆為半產以男女成形故也或因憂恐暴怒悲哀太甚或因勞力撲打損傷及觸冒暑熱慎勿用黑神散以其犯熱藥恐轉生他疾止宜用玉燭散和經湯之類凡婦人天生無乳者不治或因啼泣暴怒鬱結氣血閉塞以致乳脉不通用精猪肉清湯調和美味於食後

調益元散五七錢連服三五服更用木梳梳乳房週迴則乳汁自下也

又一法猪蹄調下益元散連服之

又一法針肩井二穴長驗

小兒風門

凡小兒三五歲或七八歲至十餘歲發驚涎潮搐搦如拽鋸不省人事目瞪喘急將欲死者內經曰此者得之在母胎胞之所受悸惕驚駭恐懼之氣故令小兒

輕者為驚風天吊重者為癇病風搐胎中積熱者為
臍風已上諸風證可用吐涎散吐之吐訖宜珠犀龍
麝清涼墜痰之藥其食乳子母皆宜服之安魂定魄
之藥定志丸之類是也故婦人懷孕之月大忌悲憂
驚怖縱得子必有前疾小兒風熱涎嗽者可以通聖
加半夏同煎溫服

凡小兒疳澁眼數日不開皆風熱所致可服涼膈散瀉
肝經風熱鬱甚鬱結散而自開也

凡小兒通身浮腫是風水腫也小便不通者宜利小便則愈內經曰三焦閉塞水道不行水滿皮膚身體痞腫是乘之故可用長流水加燈心煎五苓散時時呷之更於不透風處浴之汗出則腫消一汗減半再汗減七八分三汗消盡內外俱行也

二火類

凡小兒瘡疱癰疹麤瘡丹燥等疾如遇火運勝時熒惑亂行之者不可使用升麻散解之升麻湯味辛性溫

內經曰積溫而成熱是謂重火止可以辛涼之劑解之如遇平時可以辛溫蓋平時無事便同水化然而更宜審察病機甚者亦不可以辛溫但發散之後便以涼膈散加當歸及白虎湯玉露散煎服之更甚者解毒湯調胃散下之古人云痲疹瘡疱首尾俱不可下皆悞矣豈不聞揚湯止沸不如抽薪內經曰五疔五疔之歲多發此病者蓋明相火之所為也又曰少陽客氣勝丹疹外發又曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火王

太僕又謂百端之起皆自心生豈可使用辛溫發散乎致熱勢增劇漸成臟毒下血咬牙發搐大熱明矣如白虎湯加人參涼膈散加當歸桔梗勿問秋冬但見瘡疹用之神良

凡小兒瘡疱癰疹麩瘡丹燥斑毒之後臟毒下血內經曰少陽客氣勝則丹燥瘡疹發于外也蓋餘熱不解故臟毒下血治以黃連解毒湯白虎湯涼膈散臨證選而用之所謂白虎舊說秋冬勿用皆悞也但有此

證便用之蓋其證屬相火故也大人亦同

凡小兒丹瘤浮腫毒赤走引遍身者乃邪熱之毒者可
用磁片搬出紫血其病立愈如不愈者後用涼膈散
加大黃芒硝利三五行為妙次用拔毒散掃三五度
愈矣經曰丹燦赤瘤火之色也相火主之

凡小兒有赤瘤暴腫可先用牛黃通膈丸瀉之後用陽
起石散傳之則腫毒自消如不消可用銚針砭刺血
出而愈矣

凡小兒甜瘡久不愈者俗呼為香瘡是也多在面部兩
耳前一法令母口中嚼白米成膏子卧塗之不過三
上則愈矣小兒并母皆忌雞豬魚兔酒醋動風發熱
之物如治甜指亦同此法

凡小兒面上瘡謂眉煉耳上瘡謂之轍耳足上瘡謂靴
癬此三者一究其本皆謬名也經曰諸痛瘡瘍皆屬
心火乃血熱劇而致然也或謂內經曰大槩不可使
熱以為皆然此不明造化之道也慎勿妄信可用銜

鍼刺之出血一刺不愈當復刺之再刺不愈則三刺必愈矣內經曰血實者決之眉煉不可用藥傅之以其瘡多痒痒則爬矣藥入眼則目必損矣

凡小兒牙疳齒齲者是斷腐爛也下牙屬手陽明大腸之經燥金為主上牙屬足陽明胃經濕土上下是腸胃二經也或積熱於內或因服銀粉芭荳大毒之藥入于腸胃乳食不能勝其毒毒氣循經而至于齒斷牙縫嫩薄之分反內害也可以麝香玉線子治之乳

母臨卧常服黃連解毒湯一服牙疳病則愈矣


凡小兒身熱吐瀉腹滿不進飲食可急與牛黃通膈丸
下過四五行則自愈矣蓋乳食便屬水甚則成濕以
治濕法治之用燥熱之藥非也

凡小兒水泄不止可用五苓散與益元散各停用新水
調下三二錢頻服不拘時候若暴速注下甚者屬火
涼膈通聖等散治之用者勿輕非深於造化者未易
此語

凡小兒大人小便不通內經謂三焦約約者不行也
用長流水煎八正散時時灌之大小便利則止若不
因熱藥所攻而致此者易治或因多服熱藥而燥劇
至此者非惟難治不幸夫耳亦可用蜜水調益元散
送通膈丸

凡小兒久瀉不止至八九月間變為秋深冷痢泄瀉者
清白時時撮痛乳癖不化可用養脾丸如黍米大每
服二三十丸米飲送下日進三服則愈益黃散亦可

凡治小兒之法不可用極寒極熱之藥及峻補峻瀉之劑或悞用芫荳杏仁硫黃膩粉之藥若用此藥反生他病小兒易虛易實腸胃嫩弱不勝其毒若治之用此陰陽利水道最為急用桂苓甘露散之類



儒門事親卷十一

欽定四庫全書

子部

儒門事親卷十二

詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣呂雲棟

謄錄監生臣唐作梅

欽定四庫全書

儒門事親卷十二

金 張從正 撰

吐劑

三聖散

防風

三兩
去蘆

菴蒂

三兩 搗淨 碾破 以蒂卷定 連紙
剉細 去紙 用籠羅子羅過 另放

未料 滓炒 微黃 次入

末一處 同炒 黃用

藜蘆

去苗及心 加減用之
或一兩 或半兩 或一

分

右各為麤末每服約半兩以薑汁三茶盞先用二盞煎三五沸去薑汁次入一盞煎至三沸却將原二盞同一處熬二沸去滓澄清放溫徐徐服之不必盡劑以吐為度

芩蒂散

芩蒂

七十
五箇

赤小豆

七十
五箇

人參

半兩
去蘆

甘草

半兩或二
錢五分

右為細末每服一錢或半錢或二錢量虛實加減用

之空心齏汁調下服之

稀涎散

猪牙皂角

不蛀者去支弦
秤一兩灸用之

碌礬

藜蘆

半兩

右為細末每服半錢或一二錢斡開牙關漿水調下

灌之

蔚金散

蔚金

滑石

川芎

各半兩

右為細末每服一二錢量虛實加減以齏汁調下空

心服之

茶調散

亦一名

二仙散

芫蒂不以多少好茶中停

右為細末每服二錢薑汁調下空心用之

獨聖散

芫蒂不以多少

右為細末每服一錢或二錢薑汁調下服之脇痛加
全蝎頭痛加蔚金

碧雲散 治小兒驚風有涎

膽礬

兩半

銅青

一分

粉霜

錢一

輕粉

分一

右研為細末每服一字薄荷湯調下用之如中風用漿水調服

常山散

常山

兩二

甘草

兩二

半

右為細末水煎服之空心

青黛散

猪牙皂角

乙箇

玄胡索

乙箇

青黛

少許

右為細末鼻內灌之其涎自出

汗劑

防風通聖散

防風 川芎 當歸 芍藥 大黃 薄荷

麻黃

去根不去節

連翹

芒硝

已上各半兩

石膏

黃芩

桔梗

已上各二兩

滑石

三錢

甘草

二兩

荆芥

白朮

山梔子

已上各乙兩

右為麤末每服五七錢水一大盞生薑三片煎至七分去滓熱服如涎嗽加半夏五錢生薑製過

雙解散

通聖散與益元散相合中停水一鍾生薑豈豉葱

白同煎

浮萍散 治癩風

浮萍

乙兩

荆芥

川芎

甘草

麻黃

去根

已上各一兩或加當歸芍藥

右為麤末每服一兩水二盞煎至七分去滓溫服汗出則愈

升麻湯

升麻去土

葛根

芍藥

甘草炒已上各一兩

右為麤末每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服不計時候

麻黃湯

麻黃乙兩去根

官桂七錢

甘草三錢干炙

杏仁二十箇去皮

尖麩炒
黃色用

右為麤末每服三錢水一中盞煎至七分去滓溫服

汗出自解

桂枝湯

桂枝

乙兩

茯苓

半兩

芍藥

乙兩

甘草

七錢

右為麤末每服三錢水一盞生薑棗一同煎去滓溫服

下劑

導水丸

大黃

二兩

黃芩

二兩

滑石

四兩

黑牽牛

四兩

另取頭末用

加甘遂一兩去濕熱腰痛泄水濕腫滿久病則

加

加白芥子一兩去遍身走注疼痛

加朴硝一兩退熱散腫毒止痛久毒宜加

加郁李仁一兩散結滯通關節潤腸胃行滯氣

通血脈

樟柳根一兩去腰腿沉重

右為細末滴水丸梧桐子大每服五十九或加至百
丸臨卧溫水下

禹功散

黑牽牛頭末

四兩

茴香

乙兩炒

或加木香

乙兩

右為細末以生薑自然汁調一二錢臨卧服

通經散

陳皮

去白

當歸

各乙兩

甘遂

以麩包不令透
水煮百餘翻取出用冷水

浸過去
麵培乾

右為細末每服三錢溫湯調下臨卧服

神祐丸

甘遂

依前製用

大戟

培浸煮醋乾用

芫花

醋浸煮各半兩

黑牽牛

乙兩

大黃

乙兩

右為細末滴水丸小苳大每服五七十九臨卧溫水

下

琥珀丸

右為前神祐丸加琥珀一兩是也

益胃散

甘遂

依前製過用

右為細末每服三錢以獾猪腰子細批破以鹽椒等物淹透爛切摻藥在內以荷葉裏燒熟溫淡酒調服

大承氣湯

大黃

半兩

厚朴

乙兩

枳實

一枚
麩炒

芒硝

半兩

右為麤末每服三五錢水一盞煎至七分去滓服以

意加減

小承氣湯

大黃 厚朴已上各乙兩 枳實 乙枚

右為麤末同前煎服

調胃承氣湯

大黃 甘草 炙 朴硝已上各半兩

右為麤末每服五七錢水一盞煎三五沸去滓溫服

食後

桃仁承氣湯

桃仁

去皮尖乙
十二個

官桂

甘草

芒硝

已上各半兩

右剉如麻苳大每服三五錢水一大盞煎至七分去

滓溫服

玉井散

菴萋根

二兩

甘遂

乙兩製用

右為細末以麝香湯調下三錢臨卧服

水煮桃紅丸

黑牽牛頭末

兩半

芫薺末

二錢

雄黃

乙錢水飛
過用之

乾胭脂

少許

右以黃水調麵為丸以水煮令浮熟取出冷水拔過
射香湯下

無憂散

黃耆

木通

桑白皮

陳皮已上各乙兩

胡椒

白朮

木香

各半兩

牽牛頭末

四兩

右為細末每服三五錢以生薑自然汁調下食後

泄水丸

又方藏用丸一料加芒硝半兩
商陸半兩為末水丸依前服

大戟 芫花 甘遂 海帶 海藻 郁李仁

續隨子已上各半兩 樟柳根

乙兩

右為細末水煮棗肉為丸如小芫大每服五七十九

水下

牛黃通膈丸

黑牽牛 大黃 木通已上各半兩各另取末

右為細末水丸如黍粒大量兒大小三五十九或百

丸水下

四生丸 一名潤腸丸

黑牽牛 大黃 朴硝 皂角 去皮絃蜜炙

已上各等分

右為細末水丸如梧桐子大每服七八十九食後溫
水下

內托散

大黃

牡蠣

已上各半兩

甘草

三錢

瓜蒌

二箇

右為末水一大盞煎三五沸去滓露冷服

藏用丸

大黃

黃芩

已上各二兩

滑石

黑牽牛

各四兩

右為末水丸桐子大每服五七十九食後溫水下

神芎丸

藏用丸一料內加黃連薄荷川芎各半兩水丸桐

子大水下

進食丸

牽牛

乙兩

芭荳

三箇去油心膜

右為末水丸每服二三十丸食後隨所傷物送下

牛黃白朮丸

治腰脚濕

黑牽牛末

大黃已上各二兩

白朮

乙兩

右為末滴水丸桐子大每服三十九食前生薑湯下

要利加至百丸

玉燭散

以四物湯承氣湯朴硝各等分水煎去滓食前服
三和湯

以四物湯涼膈散當歸各中停水煎服

丁香化癖散 治小兒脾

白丁香 蜜陀僧 舶上硫黃 已上各乙錢

硃砂

半錢

輕粉 少許

右研細末每兒一歲服半錢男病女乳調女病男乳
調後用通膈泄

抵當湯

水蛭

十箇

蠱虫

十箇去翅足燬

大黃

乙兩

桃仁

七枚去皮尖槌

右剉如麻豆作一服水二盞煎至七分去滓溫服

抵當丸

蠱虫

五箇

桃仁

六枚

大黃

三分

水蛭

五箇

右為細末只作一九水一大盞煮一九至七分頓服

十棗湯

紫芫花

醋浸煮

大戟

甘遂

製

已上各等分

右為末每服半錢水一盞棗十枚同煎取半盞服

除濕丹

檳榔 甘遂 威靈仙 赤芍藥 澤瀉

葶藶 已上各二兩 乳香別研 沒藥別研

已上各一兩 黑牽牛末半兩 大戟三兩炒

陳皮四兩去白

右為細末麵糊和丸如桐子大每服三五十九水下

利膈丸

牽牛

四兩生

槐角子

乙兩炒

木香

乙兩

青皮

乙兩

皂角

去皮酥炙

半夏

洗各二兩

右為細末生薑麵糊為丸桐子大每服四五十九水

下

三一承氣湯

大黃

芒硝

厚朴

去皮

枳實

已上各半兩

甘草

乙兩

右剉如麻豆大每服半兩水一大盞生薑三片煎至

六分入硝去滓熱服

大陷胸湯

大黃

乙兩半

芒硝

乙兩八錢半

甘遂末

一字

右為水一盞煮大黃至八分去滓入硝一沸下甘遂末溫服

小陷胸湯

半夏

湯洗乙錢半

黃連

乙分

芩萸實

一枚用四分之一

右剉麻豆大水二盞先煮芩萸至一盞半下諸藥取

八分去滓溫服未利再服

握宣丸

檳榔 肉桂 乾薑 附子 甘遂 良薑

薤子 芫荳 已上各等分 入礪黃 乙錢

右為細末軟米和丸桐子大早辰先椒湯洗手放溫
揩乾用生油少許泥手心男左女右磨令熟握一九

宣一二行

風門

防風通聖散 方在汗門中附

防風天麻散

防風 天麻 川芎 羌活 白芷 草烏頭

荆芥 當歸 甘草 滑石 白附子 已上各

半兩

右為末熟酒化蜜少許調藥半錢加至一錢少時覺藥行微麻為度如作丸煉蜜和彈子大熟酒化下一丸或半丸

防風湯

防風 麻黃 獨活 秦艽去蘆 黃芩 石膏

當歸 白朮 已上各半兩

右為麤末入半夏片子令攪勻每服四錢水二中盞
入生薑七片煎至一盞去滓取清汁六分入麝香少
許帶熟食後服

祛風丸

川烏炮去皮臍

草烏炮

天南星

半夏薑製

蒸豆粉

甘草

川芎

殭蚕 藿香

苓苓香

地龍去土

蝎稍炒

已上各一兩

川薑半兩

右為細末藥末一兩用蒸豆粉一兩以白麵二兩滴水
和丸如桐子陰乾細嚼茶清下三五丸至五七丸
食後初服三丸以漸加之

排風湯

當歸去蘆

杏仁去皮尖
麩炒

防風去蘆

白蘚皮

白朮

芍藥

官桂

去麤皮

川芎

甘草

炒各三兩

獨活

麻黃

去節

茯苓

去皮各三兩

右為麤末每三錢水一盞半入生薑四片同煎至八

分去滓溫服不計時候

小續命湯

麻黃

去節

人參

去芦

黃芩

芍藥

川芎

甘草

炙

杏仁

湯炮去皮尖炒

防己

官桂

去皮

防風

去蘆

各一兩

附子

半兩去皮臍

右除附子杏仁外合搗為麤末後入二味攪勻每服
三錢水一盞半入生薑五片煎至一盞去滓少熱服
食後

消風散

川芎

羌活

去蘆

人參

去蘆

白茯苓

去皮

白殭蚕

炒

蟬殼

去土

已上各一兩

陳皮

去白

厚朴

去麤

皮薑
製

已上各半兩

右為細末每服二錢茶清調下

川芎散

川芎 荆芥 甘菊 薄荷 蟬殼 蔓精子

已上各二兩 甘草

乙兩
炙

右為細末茶酒任下三二錢食後

搜風丸 單名人參半夏丸

人參 茯苓 南星 已上各半兩 半夏 乾

生薑 白礬 生 凝水石 已上各一兩 蛤粉 二兩

薄荷 半兩 藿香

右為細末與藏用丸末各中停水丸如豌豆大每服
三十九生薑湯送下

當歸川芎散

當歸 川芎 已上各半兩 甘草 二兩 黃芩 四兩

薄荷 乙兩 確砂仁 一分

右為細末溫水調下一二錢

愈風餅子

川烏 半兩 炮裂
川芎 甘菊 白芷 防風 細辛

天麻 羌活 荆芥 薄荷 甘草炙 已上各

一兩

右為細末水浸餛餅為劑捏作餅子每服三五餅子
細嚼茶酒送下不計時候

疎風丸

通聖散一料加天麻羌活獨活細辛甘菊首烏各
半兩

右為細末煉蜜和丸彈子大朱砂為衣每服一九細

嚼茶酒下

通頂散

石膏 川芎 瓜蒂 已上各等分 藜蘆少許

右為細末鼻內嚙

胃風湯

人參去蘆 茯苓去皮 川芎 官桂 當歸 芍藥

白朮

右件各等分為末每服三錢水一盞入陳粟米煎空

心服之

香芎散

香附子炒

貫芎

石膏

水飛

白芷

甘草

薄荷 已上各一兩

川烏

半兩炒去皮臍

右為細末每服二錢溫酒茶清調下無時

鐵彈丸

地龍

去土

防風

白膠香

沒藥

木鱉

去皮

草烏頭

水浸炮

白芷

五苓脂

當歸

已上

各用一兩

細墨

錢三

麝香

研另

乳香

研另

升麻

各二錢

右末糯粥丸彈子大每服一九生姜酒下

暑門

瘧附

白虎湯

知母

乙兩半
去皮

甘草

乙兩

糯米

乙合

石膏

四兩亂
紋者另

為末

右剉如麻豆大粳米拌勻另水一盞煎至六分去滓

溫服無時日三四服或眩嘔者加半夏半兩薑製

桂苓甘露散

官桂

半兩

人參

藿香

已上各半兩

茯苓

白朮

甘草

葛根

澤瀉

石膏

寒水石

已上各一兩

滑石

二兩

木香

二分

右為細末每服三錢白湯點下新水或生薑湯亦可
化痰玉壺丸

南星

半夏

並生用

天麻

已上各半兩

白麵

三兩

右為細末滴水丸如桐子大每服三十九丸用水一大
盞先煎令沸下藥煮候浮即熟漉出放溫別用生薑
湯下不拘時服

益元散

滑石 六兩

甘草 乙兩

右為細末每服三錢蜜水新水調下

玉露散 治暑

寒水石 滑石 石膏 苧萋根 已上各四兩

甘草 二兩

右為細末每服五錢重新水調下

石膏散

石膏 乙兩

人參 去蘆

甘草 炙

各半兩

右為細末新水蜜水調三錢生薑湯亦可

辰砂丹 治瘡

信 乙錢

雄黑豆

六十箇或
二兩重

右為細末朱砂為衣端午日合不令雞犬婦人見每服一丸無根水下

溫脾丸

信 乙錢

甘草 二錢

紫河車 三錢

豆粉 四兩

右為末滴水丸每服半錢作十九臨卧無根水下

溫脾散

紫河車 菘苳 已上各一兩

甘草 半兩

砒 乙錢

研別

右為細末後入砵研勻每服半錢新水盞調下如是
隔日發直待臨睡服藥如頻日發只夜深服忌葷酒
魚兔等

濕門 嗽附

五苓散

官桂 澤瀉 猪苓 去黑皮 茯苓 去皮 白朮 各半兩

右為細末每服二錢熱湯或新水調下

葶藶木香散

苦苧蘆

茯苓

去皮

猪苓

去皮

已上各一分

木香

半錢

澤瀉

木通

甘草

各半兩

官桂

乙分

滑石

三錢

右為細末每服三錢生薑湯調下食前服

白朮木香散

白朮

猪苓

澤瀉

赤茯苓

各半兩

木香

檳榔

各三錢

陳皮

二兩去白

官桂

乙錢

滑石

三兩

右為細末每服五錢水一盞生薑三片同煎至六分

溫服食後

大橘皮湯

橘皮

乙兩半

木香

乙分

滑石

六兩

檳榔

三錢

茯苓

乙兩

猪苓

去黑皮

澤瀉

白朮

官桂

已上各

半兩

甘草

二錢

右為末每服五錢水一盞生薑五片煎至六分去滓

溫服食後

神助散

苦苧蘆

三兩炒

黑牽牛

三兩半微炒
取頭末用

澤瀉

二兩

猪苓

二兩
去皮

椒目

半兩

右為細末每服葱白三莖漿水一盞煎至半盞入酒
半盞調藥三錢絕早面東服之

桂苓白朮丸

官桂

茯苓

半夏

已上各一兩

白朮

乾生薑

一分

橘皮

去白

澤瀉

黃連

各半兩

黃栢

二兩

右為末麵糊為丸如小菝大每服三五十丸姜湯下

食後

桂苓白朮散

官桂 茯苓 白朮 已上各半兩 甘草

澤瀉 石膏 寒水石 已上各一兩 滑石

二兩

右為細末熱湯調三錢新水生薑湯亦可食後服

白朮調中湯

白朮 茯苓 橘皮

去白

澤瀉

已上各半兩

甘草 乙兩

乾薑 炒

官桂

硝砂仁

藿香

已上各一分

右為末白湯化蜜少許調下二錢無時煉蜜每兩作
十九名曰白朮調中丸

寧神散 治嗽

御米殼

二兩
蜜炒

人參

苦苧蘆

已上各一兩

右為末入烏梅同煎三五沸去滓稍熱服食後

寧肺散

御米

蜜炒
去籜

甘草

乾薑

當歸

白礬

陳皮

已上各一兩

右為末煎薑汁調三錢

人參補肺散

人參

麻黃

去節

白朮

防己

防風

各等分

桑白皮

倍加

右剉咀咀以漿水一椀煎至半去滓溫服每用半兩

各秤過

白朮湯

白朮 甘草 當歸 陳皮 桔梗 枳殼

各等分

右為麤末水煎去滓溫服三五錢

薏苡仁湯

桔梗 乙兩

甘草 二兩

薏苡仁 三兩

右剉如麻苴大每服五錢水煎入糯米為引米軟為度食後

益黃散 治小兒痢

陳皮

乙兩

青皮

柯子肉

甘草

已上各半兩

丁香

二錢

右為細末每服二錢水煎食前服

香連丸

木香

柯子肉

炒麵

黃連

炒

已上各半兩

龍骨

二錢

右為細末飯丸如黍米大每服二十九米飲湯下

火門

涼膈散

大黃

乙兩

連翹

四兩

甘草

黃芩

薄荷

朴硝

山梔子

已上各一兩

右麤末每服三五錢水一盞入蜜竹葉煎三五沸去

滓溫服無時

黃連解毒湯

黃連

黃蘗

黃芩

大梔子

已上各等分

右劉為麻豆大每服五錢水二盞煎至八分去滓溫服

瀉心湯

大黃 甘草炙 當歸 芍藥 麻黃 荆芥

已上各一兩半 白木二錢半

右為細末每服二錢水一盞生薑薄荷少許同煎至七分去滓溫服

八正散

大黃 蘧麥 木通 篇竹 車前子 甘草

山梔子 已上各一兩 滑石 二兩 加木香一

兩尤佳

右為麤末每服三五錢水一盞入燈心煎至七分去

滓溫服

調胃散 治傷寒吐逆四肢厥冷

水銀 舶上硫黃 各半兩

右二味先研硫黃極細次入水銀同研至深黑每服

一錢病重者二錢溫米飲調服不拘時

三黃丸

大黃 黃芩 黃栢 已上各等分

右為末水丸每服三十九水下

又方去黃芩用黃連

芍藥藥皮丸

芍藥 白者

黃蘗 去皮

各一兩 當歸 黃連

各半兩

右為末水丸桐子大每服三十九水下食前

大金花丸

黃連 黃柏 黃芩 大黃 各等分

右為末水丸新水下三十九加梔子減大黃名梔子

金花丸

清涼飲子

大黃^蒸 赤芍藥 當歸 甘草^炒 已上各等

分

右為末每服一二錢水一盞煎至七分去滓溫服食
後以意加減

黃連清心湯

涼膈散加黃連半兩是也

犀角散

黃連 大黃 芍藥 犀角 甘草 各等分

右為麤末每服五錢水一盞煎至七分去滓溫服無

時

黃連木通丸 治心經畜熱夏至則甚

黃連

二兩

木通

半兩

右為末生薑汁打麵糊和丸每服三十九食後燈心湯下日三服

燥門

神功丸

大黃

蒸麩裏

訶子皮

麻子仁

另搗

人參

去蘆

已上各一兩

右為細末入麻子仁搗研勻煉蜜丸如桐子大每服二十九溫水下或酒或米飲下食後臨卧如大便不通加服

脾約丸

麻仁

一兩二錢半

枳實

麩炒

厚朴

去麩皮

芍藥

已上各二兩

大黃

四兩蒸

杏仁

去皮尖炒黃乙兩二錢

右為細末煉蜜為丸桐子大每服二十九臨卧溫水

下

麻仁丸

郁李仁

去皮另搗

火麻子仁

另搗

二味各二兩

大黃

二兩半生半蒸

檳榔

兩半

乾山藥

防風

去蘆

枳殼

炒去蘆七錢半

羌活

木香

各五錢半

右為細末入另搗者三味攪勻煉蜜丸如桐子大每服二十九至三十九溫水下食後牽牛滑石亦少

潤體丸

郁李仁

大黃

桂心

黑牽牛

當歸

黃栢

並生用
各半兩

輕粉少許

右為細末滴水丸如桐子大每服三十九至四十九
溫水或生薑湯下

寒門

薑附湯

乾薑

二兩另
為籠末

附子

乙兩生用去
皮臍細切

右二味攪勻每服三錢水一盞半煎至一盞去滓溫

服食前

四逆湯

甘草 三兩

乾薑 半兩

附子 半兩生用去皮
臍切作片子

右為麤末每服三五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服無時

二薑湯

良薑 乾薑 炮 二味各三兩

右為細末酒煮糊為丸桐子大每服三十九空心米飲湯下

未附湯

黑附子

重乙兩

白朮

乙兩半

甘草

七錢半炙

右為細末每服三五錢水一盞半生薑五片棗二枚
劈破同煎至一盞去滓溫服食後

大已寒丸

附子

炮去皮臍皮

川烏頭

炮去皮臍剉作豆大再炒黃

乾薑

炮製

良薑

炒

官桂

去皮蘼

吳茱萸

炒

已上各一兩

右為細末醋糊為丸桐子大每服五七十九米飲下

食前

理中丸

人參

去蘆

白朮

乾薑

甘草

炙

附子

炮去皮臍

已上各一兩

右為細末煉蜜為丸每兩作十九彈子大每服一九以水一盞化破煎至七分稍熱服空心

平胃散

厚朴

薑製

陳皮

二味各三兩

蒼朮

五兩
泔浸

甘草

炒三兩

右為末每服二錢水一盞生薑三片棗二枚煎至七

分去滓食前溫服

養脾丸

乾薑

炮

硝砂

各二兩

茯苓

去皮

人參

去芦

麥蘗

炒

各一兩

白朮

兩半

甘草

炒

乙兩半

右為細末煉蜜和丸每兩作八九每服一九細嚼生

薑湯下

兼治於內者

大柴胡湯

柴胡

四兩

黃芩

赤芍藥

各一兩半

半夏

乙兩

二錢

枳實

二錢

大黃

乙兩

半

右為麤末入半夏片子每服三錢水一盞半入生薑五片棗一枚煎至一中盞濾去滓溫服食後

小柴胡湯

柴胡

四兩
去蘆

黃芩

人參

半夏

湯洗七次切片

甘草

已上各一兩半

右為麤末每服三錢水一盞半生薑五片棗一枚劈
破同煎至七分去滓溫服不計時候

柴胡飲子

柴胡 人參 黃芩 甘草 大黃 當歸

芍藥 已上各半兩

右為麤末每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去

滓溫服

防風當歸飲子

柴胡 人參 黃芩 防風 甘草 芍藥

大黃 當歸 滑石 已上各一兩

右為麤末每服三五錢生薑三片水一盞煎至七分
去滓溫服不拘時候

白朮湯 治孕婦痢嘔吐血

白朮 黃芩 當歸 各等分

右為末每服二三錢水煎食前服

兼治於外者

桂苓湯 麻黃湯 升麻湯

已上三方在前汗法中附

五積散

蒼朮

二兩
四錢

桔梗

乙兩
四錢

枳殼

麩
炒

陳皮

二味各
六錢

白芷

川芎

當歸

甘草炙

官桂

去蘂皮

半夏

湯浸

茯苓

各三
錢

麻黃

乙錢
去節

厚朴

乾薑 各四錢

右除官桂枳殼別為末外以慢火炒令黃色為末與
官桂等攪勻每服三錢水一盞半入生薑五片葱白
三寸鹽豉七粒同煎至七分去滓溫服無時

青衿散 治咽喉

益元散加薄荷青黛生蜜丸如彈子大噙化

獨治於內者

陷胸湯

大黃

二兩半

芒硝

乙兩八錢半

甘遂

乙字另為末

右以水三盞先煮大黃至一盞去滓下芒硝令沸次下甘遂末放溫服之

大黃丸

大黃 黑牽牛 枳殼 木通 已上各一兩

右為末滴水丸如桐子大每服三十九食後生薑湯下

備急丸

巴豆

去皮油

大黃

乾薑

炮

已上各一兩

右為細末煉蜜丸桐子大每服三丸溫水下不拘時

服

枳殼丸

商枳殼

乙兩
麩炒

牽牛頭末

四兩

右為細末水丸如桐子大每服三十九食前溫酒或
生薑湯下

蓮殼散 治血崩

梭毛

燒
灰

蓮殼

燒
灰存性二
味各半兩

香附子

三兩
炒

右為末米飲調下三四錢食前

木香檳榔丸

木香 檳榔 青皮 陳皮 廣茂燒 黃連麩炒

已上各一兩 黃栢 大黃各三兩 香附子炒

牽牛各四兩

右為細末水丸如小豆大每服三十九食後生薑湯

下

導飲丸

青皮 陳皮 京三稜炮 廣茂炮 黃連

枳殼麩炒 已上各一兩 大黃 黃蘗 已上各

三兩 香附子炒 黑牽牛 已上各四兩

右為細末桐子大用水丸每服三五十九食後生薑湯下

五香連翹散

丁香 青木香 沉香 熏陸香 麝香 木通
連翹 桑寄生 獨活 升麻 大黃 已上各

等分

右為麤末以竹瀝煎五七錢末利加大黃去滓稍熟以利為度

四物湯

川芎 當歸 熟地黃 芍藥 已上各等分

右為麤末每服三四錢水一盞煎三五沸去滓溫服
空心加草龍膽防己名一醉散治目暴發加蒲黃治
娠婦漏血

當歸散 治血崩

當歸

乙兩

龍骨

二兩
炒赤

香附子

三錢
炒

梭毛灰 五錢

右為末米飲調三四錢空心服

又一方當歸白芍藥香附炒各等分為末米飲湯調

下食前服

又當歸散 行經

當歸 杜蒺藜 各等分

右為末米飲湯調服食前

葛根散 解酒毒

甘草 乾葛花 葛根 硝砂仁 貫衆

各等分

右為麤末水煎三五錢去滓服

定志丸

栢子仁 人參 茯苓 遠志去心 茯神

酸棗仁

右為末酒糊丸小豆大每服五七十九生薑湯下

欖榔丸

欖榔

乙錢半

陳皮

乙兩

木香

乙錢半

牽牛

半兩

右為末醋糊丸桐子大每服三十九生薑湯下

小欖榔丸

枳殼

陳皮

牽牛

已上各等分

右為細末水丸食後生薑湯下三四十丸

蘧麥散 治酒積

甘遂半兩
製

蘼麥 葛根 麥蘗 已上各一兩

右為末每服二錢酒調服

治氣積方 香附子為末生姜湯調下三二錢

獨治於外者

青金散

芒硝半錢

青黛半錢

乳香 沒藥 各少許

右為細末鼻內嚙

拔毒散

寒水石不以多少燒令赤

右研為末以新水調雞翎掃痛處

水澄膏

雄黃

水飛
三錢

黃連

半兩

蔚金

二錢

黃栢

半兩

大黃

半兩

黃丹

半兩水飛

右為細末量所腫處用藥多少新汲水半盞炒藥在
內須更藥沈慢去其澄者水盡然後用槐柳枝攪藥
數百餘轉如麵糊相似勻以小紙花子攤藥塗腫處

更以雞翎撩涼水不住掃之

魚膽丸

草龍膽 青鹽 腦子 已上各半兩 黃連

乙兩

去鬚

硃砂 南硼砂 麝香 鯉魚膽 已上各

二錢

右除草龍膽鯉魚膽外同為細末先將草龍膽同微研破以河水三升浸春秋二宿夏一宿冬三宿將浸者痛搽極爛用絹袋濾去滓於石器內慢火熬成膏

子點於水內不散用指頭捏開有絲乃膏子成然後
入魚膽拌勻將膏和上件藥末作劑丸如粟米徐徐
點可視之

金絲膏

黃丹 代赭石 玄精石 已上各半兩

爐甘石 乙兩 燒 腦子 半錢 黃連 麩仁 去皮 油

二味各三錢 白丁香 南硼砂 二味各一錢

右除硼砂腦子外同為細末以河水一升白砂蜜三

兩同熬三五沸然後入藥末再熬至半茶盞以上用
綿子濾過去滓次入研砂腦末攪勻定磁器內放徐
徐點眼大有神効

生肌散

黃連

錢三

蜜陀僧

兩半

乾胭脂

錢二

雄黃

乙錢

菡豆粉

錢二

輕粉

乙錢

右為細末以溫漿水洗過用無垢軟帛搵淨藥貼之

赴筵散

五倍子 蜜陀僧 已上各等分

右為細末先入漿水漱過乾貼

麝香玉線子

豆粉

半兩

信

乙錢

枯白礬

乙錢半

右三件同研入麝香半錢再研為細末滴水和於手背上搥作線如用時先以漿水嗽了口用毛翎了縫中淨臨卧乾貼或為線子住於縫中

人參化癭丹 治贅

海帶 海藻 海蛤 昆布 已上四味皆焙

澤瀉炒 連翹 已上並各等分 猪靨 羊靨

各十枚

右為細末蜜丸如雞頭大臨卧噙化一二九

通氣丸 同上所治

海藻 海帶 昆布 木通 甘草 已上各一

兩 訶子 薄荷 已上各半兩 杏仁少許
煮浸

右為細末煉蜜和丸每夜噙化一九忌油膩物

又方

海藻 海蒂 昆布 澤瀉 木通 猪鬃

羊鬃 各五枚 海蛤 連翹

右為細末研鬃為丸如雞頭大每服一九臨卧噙化

消毒散 治喉腫

當歸 荊芥 甘草 各等分

右為末水煎三五錢去滓熱嗽

煮肝散 治雀目

青蛤粉 夜明砂 穀精草 已上各等分

右為細末每服五七錢猪肝內煮熟細嚼茶清下

枯瘤方

硃砂 粉霜 雄黃 已上各二錢 輕粉

沒藥 乳香 已上各一錢 土黃三錢 麝香少許

右為細末以津調塗瘤頂外邊歇一菲葉先花紙貼
之上以小黃膏貼之

小黃膏

黃栢 黃芩 大黃 已上各等分

右為細末以水調為糊比前藥大一遭三日一易至八九上不取直候可取

剪刀藥

石灰

一斤陳年者

龍骨

四兩

刺薊

一小束

右為末杵作泥為餅子或為散貼端午日合

木香檳榔散

木香 檳榔 黃連 乳香 輕粉 蜜陀僧

已上各等分

右為細末乾摻之先以口噙漿水洗

又方加 黃栢 麝香

陽起石散

陽起石 燒

右研末新水調塗腫痛處

鉛白霜散

鉛白霜 乾胭脂 寒水石 已上各等分

腦子 輕粉 各少許

右為末 摻之

雄黃散

雄黃 乳香 沒藥 麝香 少許

右為末量瘡大小乾貼

化斑湯

紫草 升麻 甘草 各半兩

右剉麻豆大水一盞糯米二十粒煎至一盞去滓溫

服

調治

無比山藥丸

乾山藥

二兩

肉蓯蓉

四兩 剉酒浸培

五味子

六兩 揀淨

兔絲子

三兩 酒浸

杜仲

三兩 去麤皮炒

牛膝

乙兩 酒浸

澤瀉

乙兩

熟地黃

乙兩 乾

山茱萸

乙兩

茯苓

去皮 乙兩

巴戟

乙兩 去心

赤石脂

乙兩

右為細末煉蜜和丸桐子大每服二三十丸食前溫

酒下米飲亦可

當歸丸

當歸

香附子

炒

杜蒺藜

芍藥

各等分

右為末酒糊為丸如小豆大每服三五十九米飲下

香薷湯

香薷

五錢
去土

厚朴

五錢
開製

白扁豆

二錢
半生炒

右為末每服三錢水一盞入酒煎去滓溫服

石葶散

石葦

去毛

木通

各分二兩

當歸

甘草

王不留行

已上各一兩

滑石

白朮

蘧麥

葵子 芍藥

已上各三兩

右為細末每服二錢煎小麥湯調下

妙功丸

京三稜

乙兩 炮

川烏

四錢 生 去皮

大黃

乙兩

已上同

為細末好醋半升熬膏不破積水丸

神麩

麥蘖

已上各一兩

乾薑

二錢 炒 裂用

芭荳

兩箇去皮油心

半夏

半兩

茴香

乙兩炒香

官桂

牽牛

三兩揀淨

右為細末用膏丸小荳大生薑湯下十九十五丸溫涼水亦可以意加減以利為度

人參散

石膏

甘草

已上各一兩

滑石

四兩

寒水石

二兩

人參

半兩

右為末每服二錢溫水調下食後

茴香丸

茴香

八兩炒

川練子

炒

川烏

炮去皮

威靈仙

洗去

土

防風

去蘆

陳皮

已上各三兩

地龍

乙兩去土

微炒

烏藥

五兩

赤小豆

八兩

右為末酒糊為丸每服三五丸茶酒下

七宣丸

大黃

濕紙裹煨

枳實

麩炒

木香

柴胡

去蘆

訶子皮

各五兩

桃仁

六兩炒去皮尖

甘草

四兩炒

右為未煉蜜和丸如桐子大每服三十九酒下

人參調中湯

沈香

二兩

木香

白荳蔻

乙兩
用仁

甘草

乙分

腦子

乙錢

射香

半錢

人參

半兩

右為細末每服半錢用沸湯點服或入生薑鹽少許

食後服

烏金散

當歸

乙兩

自然銅

金色者煨為末醋燻乙兩

烏金石

鐵炭是三兩

大黃

乙兩童子
小便浸用

右為末每服二錢紅花酒半盞童子小便半盞同調

下食前日二服

沈香降氣湯

沈香

木香

碓砂仁

白荳蔻仁

青皮

去白

陳皮

去白

廣茂

煨

枳實

麩炒

已上各一兩

蘿白子

另末
乙兩

黑牽牛

末二
兩

大黃

二兩
炒

右為末生薑汁浸蒸餅為丸如桐子大每服三十九

橘皮湯下

枳朮丸 治氣不下降胸膈滿悶

枳實


麩炒

白朮

各半兩

右為細末燒飯為丸如桐子大每服五十九諸飲送

下



儒門事親卷十二